

BESCHERM UW HOND TEGEN DE ZIEKTE VAN LYME

Lyme-borreliose, beter bekend als de ziekte van Lyme, is de meest voorkomende door teken overgedragen infectie in Europa. De ziekte wordt veroorzaakt door spirochetes. Dit zijn spiraalvormige bacteriën die Lyme kunnen veroorzaken bij zowel mensen als dieren. In Europa wordt deze infectie voornamelijk overgebracht door teken, om precies te zijn de tekensoort *Ixodes ricinus*. Deze tekensoort komt voor in heel Europa, van Scandinavië tot aan de Middellandse Zee. De teek komt voor in bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras zoals duinen, maar ook de eigen tuin! Tekens zijn actief van het voorjaar tot diep in het najaar.

In België blijkt 10 tot 23%^{1,2} van de teken besmet te zijn met *Borrelia*. Alle honden lopen na een beet van een geïnfecteerde teek het risico de ziekte van Lyme te ontwikkelen. Het kan maanden duren voordat de symptomen van deze ziekte zichtbaar worden. Niet zelden toont een besmette hond pas

Simpele maatregelen om uw hond te beschermen:

- Vermijd zoveel als mogelijk gebieden met een hoog risico op teken: bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras.
- Controleer uw hond dagelijks op teken, vooral na een wandeling.
- Gebruik effectieve middelen tegen teken. Uw dierenarts kan u hierin adviseren.
- In gebieden waar veel (besmette) teken kunnen voorkomen wordt vaccinatie aanbevolen.

symptomen twee tot vijf maanden na een tekenbeet. Veel geïnfecteerde honden tonen helemaal geen ziekteverschijnselen.

Omdat de zichtbare symptomen die duiden op Lyme vrij algemeen zijn en makkelijk verward kunnen worden met een andere ziekte, dient u bij twijfel altijd uw dierenarts te raadplegen.

Lyme-borreliose wordt behandeld met antibiotica. De behandeling is het meest effectief wanneer deze zo vroeg mogelijk wordt gestart. Het is echter mogelijk dat de infectie ondanks de behandeling blijft bestaan. In gebieden waar veel (besmette) teken kunnen voorkomen kan, naast preventieve snelwerkende producten tegen teken, vaccinatie worden overwogen.

[optionele tekst]

Een teek op de hond, en nu?

Nadat een teek een hond heeft gebeten duurt het nog ongeveer 36 tot 48 uur voordat deze de hond kan besmetten met *Borrelia*. Tekens dienen daarom tijdig verwijderd te worden. De meest veilige methode is met een teekentang. Deze tang verwijdert alle delen van de teek zonder het lichaam van de teek samen te knijpen. Er bestaan vele typen teekentangen. Vraag uw dierenarts om advies.

Lyme-borreliose, ook een mensenziekte

Ixodes-teken kunnen ook Lyme-borreliose overdragen op mensen. Elk jaar worden er 65.000³ gevallen gemeld in Europa. Symptomen bij mensen variëren van vrij algemeen zoals hoofdpijn, koorts, vermoeidheid tot de bekende karakteristieke huiduitslag (*erythema migrans*). Zonder adequate behandeling kan de ziekte zich verspreiden in gewrichten, hart en centraal zenuwstelsel. U kunt het risico op tekenbeten verminderen door lange broeken en bovenkleding met lange mouwen te dragen wanneer u door bosrijke gebieden of grasland loopt.

[optionele tekst]

1. Claerebout et al., *Parasites and Vector*, 2013, 6 (183).
2. Misonne et al., *J. Clin. Microbiol.*, 1998, 36 (11), 3352 - 3354.
3. Rizzoli A, Hauffe HC, Carpi G, Vourc'h GI, Neteler M, Rosa R. Lyme borreliosis in Europe. *Euro Surveill.* 2011;16(27):pii=19906. Available online: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19906>.

Het gebruik van deze tekst is alleen toegestaan zonder verwijzing naar Merial.